

Samtykke ved vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet

Samtykke ved vaksinasjon med TBE

Skogflåttencefalitt, på engelsk Tick Born Encephalitis (TBE) skyldes TBE-virus som kan overføres til mennesker ved bitt av skogflått.

Smitteoverføring foregår i mildt vær, i Norge vesentlig fra april-mai til utpå høsten. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Det er stor variasjon i sykdomsbildet. Noen får ingen symptomer selv om de er smittet. Andre utvikler kun en forbigående influensalignende sykdom, mens noen får den mer alvorlige varianten som er infeksjon i hjerne og hjernehinne.

Om Vaksinen:

Vaksinen brukes for å forebygge skogflåttencefalitt.

Det anbefales å vaksinere på senvinteren, i god tid før flåttseasonen som i Norge begynner i april.

Barnedoser benyttes opp til alder 16 år. Vaksinen settes intramuskulært i overarmen.

For å bli fullvaksinert trenger barnet tre doser. Andre dose gis etter 1-3 mnd intervall

Ved fortsatt behov for beskyttelse gis en tredje dose 5-12 måneder etter andre dose.

Les mer om vaksinen, effekten, vaksineintervaller, booster doser og evt bivirkninger på Fhi sine sider.

[Skogflåttencefalittvaksine \(TBE-vaksine\) - FHI](#)

